

Impfkalender 2019/2020 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2019



S Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)

K Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)

E Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	6 Wochen	2 Monate	U4 3 Monate	4 Monate	U6 11-14 Monate	U7 15-23 Monate	2-4 Jahre	U9 5-6 Jahre	J1 9-14 Jahre	15-16 Jahre	17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Rotaviren	G1 ^a	G2	U4 (G3)										
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2	N			A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie		G1	G2	G3	6-fach-Impfung	N	A1	A2	N			A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis)		G1	G2	G3	6-fach-Impfung	N	A1	A2	N			A ^d	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)					6-fach-Impfung	N							
Kinderlähmung (Poliomyelitis)						N						ggf. N	
Hepatitis B						N							
Pneumokokken		G1 ^b		G2	G3	N							S ^f
Meningokokken C					G (ab 12 Monaten)		N						
Masern					G1	G2	N						
Mumps					3-fach-Impfung MMR	3-fach-Impfung MMR + Windpocken	N					S ^e	
Röteln					G1	G2	N						
Windpocken (Varizellen)					G1	G2	N						
HPV (Humane Papillomviren)								G1+G2 ^f		N ^c			G1+G2 ^h
Gürtelrose (Herpes zoster)													
Grippe (Influenza)													S (jährlich)

Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

- U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder
- G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1-G4)
- S** Standardimpfung
- J** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- A** Auffrischung
- d** einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/iggf. Poliomyelitis
- e** Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit
- f** Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff
- g** Zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten.
- h** Zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten.